

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 47.22.87 47.13.82

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

Nouveaux numéros de téléphone : 09-06-43 et 09-27-46

BULLETIN N° 130 - 30 mai 1978

Abonnement annuel : 60 F

V I G N E

Rougeot parasitaire

La croissance rapide due au beau temps, enfin arrivé, nous amène à rappeler la nécessité d'intervenir systématiquement chaque fois que 3 nouvelles feuilles sont apparues. Les produits mis en oeuvre contre ce champignon sont également actifs contre le mildiou qui ne nous a pas encore été signalé.

Oïdium : maintenir la protection.

Acariose

La crainte que nous émettions dans notre avis du 19 mai se vérifie. Les vignes contaminées apparaissent assez nombreuses en particulier dans le vignoble de l'Aube. Intervenir le plus rapidement possible, de préférence avec un oléoparathion, produit par ailleurs actif contre la pyrale dont l'apparition ne devrait plus guère tarder.

ARBORICULTURE FRUITIÈRE

Tavelure du pommier

Des taches récentes ont été trouvées dans la journée du 26 mai (premières taches observées le 16 - Avis 128). D'autres sorties sont prévues début juin. La protection des vergers doit se poursuivre. Dans les vergers contaminés, l'emploi de fongicides systémiques est recommandé.

Oïdium qui Rappel - La coupe des brindilles oïdiées doit se poursuivre - la maladie paraît virulente sur toutes variétés (même sur golden) est à suivre particulièrement.

Pucerons : Rappel - Des dégâts importants sont à craindre dans les vergers où les foyers sont nombreux (Pruniers - Reine des Reinettes...).

Araignées rouges

Parasite à surveiller ; n'intervenir qu'en cas de grisaillement des premières feuilles des rameaux. L'éclosion des oeufs d'hiver est pratiquement terminée. En verger fortement contaminé, prévoir un traitement acaricide dans la première semaine de juin.

Carpocapse des pommes

Premières captures en piège sexuel, entre le 24-26 mai. Il est encore trop tôt pour intervenir.

P.1.230

Additif à notre liste anti carpocapse n° 128 du 19 mai :

Permethrine = sp. com. Perthrine : SOPRA. Ne pas traiter les plantes en fleurs. Délai d'emploi : 15 jours avant récolte.

Chenilles diverses

Les dégâts se poursuivent dans les vergers non traités. Sur arbres de plein vent, les Hyponomeutes sont actifs depuis plusieurs jours.

Le Chef de la Circonscription
Phytosanitaire Champagne,

J. DELATTRE.